Heptodon

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'**eptodonte** (gen. *Heptodon*) è un <u>mammifero</u> erbivoro estinto, appartenente ai <u>perissodattili</u>. Visse nell'<u>Eocene</u> inferiore (circa 50 - 49 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in <u>Nordamerica</u> (Colorado, Wyoming).

Indice

Descrizione

Classificazione

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni

Descrizione

Questo animale doveva essere solo vagamente simile ai <u>tapiri</u>, con i quali era imparentato. Lungo circa un metro e alto forse 40 centimetri, *Heptodon* era dotato di un cranio basso e allungato, le cui ossa nasali non arretrate indicano che probabilmente non si era ancora formata la caratteristica proboscide dei tapiri attuali. È verosimile, invece, che ci fosse una sorta di labbro carnoso. Il peso di *Heptodon* doveva essere di circa 15 chilogrammi.

Era presente uno spazio (diastema) tra i canini e i premolari, ma non tra il primo e il secondo premolare. I premolari, inoltre, non avevano

ancora acquisito un aspetto molariforme; i molari superiori erano lofodonti e privi di conuli, quelli inferiori erano dotati di creste trasversali. La zampa anteriore era ancora dotata di quattro dita.

Classificazione

Descritto per la prima volta da <u>Edward Drinker Cope</u> nel <u>1880</u>, *Heptodon* è noto per numerosi fossili provenienti dal Wyoming e dal Colorado, ed è considerato uno dei più antichi e basali fra i rappresentanti dei tapiroidi, il gruppo di mammiferi perissodattili a cui appartengono i tapiri e i loro parenti estinti. Considerato a lungo un rappresentante degli elaletidi (<u>Helaletidae</u>), una famiglia di tapiroidi considerata ancestrale ai tapiri, successive ricerche hanno determinato l'esclusione da questa famiglia; *Heptodon* è stato pertanto assegnato a una famiglia a sé stante, **Heptodontidae** (Holbrook, 1999), o generalmente ai <u>Tapiroidea</u> (Colbert e Schoch, 1998). Sono note due specie: *H. calciculus* e *H. posticus*.



Bibliografia

- E. D. Cope. 1880. The bad lands of the Wing River and their fauna. The American Naturalist 14(10):745-748
- M. W. Colbert and R. M. Schoch. 1998. Tapiroidea and other moropomorphs. In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), Evolution of Tertiary mammals of North America 569-582
- L. T. Holbrook. 1999. The Phylogeny and classification of tapiromorph perissodactyls (Mammalia). Cladistics 15(3):331-350

Altri progetti

Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene immagini o altri file su Heptodon (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Heptodon?uselang=it)

Collegamenti esterni

• (EN) Heptodon, su Fossilworks.org.

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Heptodon&oldid=105899638"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 21 giu 2019 alle 17:35.

Il testo è disponibile secondo la <u>licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo</u>; possono applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le <u>condizioni d'uso</u> per i dettagli.